

| レジメン名              | 一般名           | 投与量                    | 投与方法 | 投与日（用法）   | 1サイクルの期間 | 癌腫  |
|--------------------|---------------|------------------------|------|-----------|----------|-----|
| GEM療法              | ゲムシタビン        | 1000 mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | d1, 8, 15 | 28日      | 胆道癌 |
| GEMOX療法            | ゲムシタビン        | 1000 mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | d1, 8     | 21日      | 胆道癌 |
|                    | オキサリプラチン      | 100 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴静注 | d1        |          |     |
| GEMOX療法（Bi-weekly） | ゲムシタビン        | 1000 mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | d1        | 14日      | 胆道癌 |
|                    | オキサリプラチン      | 100 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴静注 | d1        |          |     |
| GEM+CDDP+TS-1療法    | ゲムシタビン        | 1000 mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | d1        | 14日      | 胆道癌 |
|                    | シスプラチン        | 25 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴静注 | d1        |          |     |
|                    | テガフル<br>ギメラシル | 40-60 mg/日             | 経口   | d1-7      |          |     |
| GEM+CDDP療法         | ゲムシタビン        | 1000 mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | d1, 8     | 21日      | 胆道癌 |
|                    | シスプラチン        | 25 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴静注 | d1, 8     |          |     |