

レジメン名	一般名	投与量	投与方法	投与日（用法）	1サイクルの期間	癌腫
GEM療法	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	点滴静注	d1, 8, 15	28日	膵臓癌
FOLFIRINOX療法	イリノテカン	125 mg/m ²	点滴静注	d1	14日	膵臓癌
	オキサリプラチン	85 mg/m ²	点滴静注	d1		
	レボホリナート	200 mg/m ²	点滴静注	d1		
	フルオロウラシル	400 mg/m ²	点滴静注	d1		
	フルオロウラシル	2400 mg/m ²	点滴静注	d1		
Nab-PTX+GEM療法	アルブミン懸濁型 パクリタキセル	125 mg/m ²	点滴静注	d1, 8, 15	28日	膵臓癌
	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	点滴静注	d1, 8, 15		
Nab-PTX療法	アルブミン懸濁型 パクリタキセル	100 mg/m ²	点滴静注	d1, 8, 15	28日	膵臓癌
Lipo-CPT-11+5-FU/I-LV療法	イリノテカン・リポソーム製剤	70 mg/m ²	点滴静注	d1	14日	膵臓癌
	レボホリナート	200 mg/m ²	点滴静注	d1		
	フルオロウラシル	2400 mg/m ²	点滴静注	d1		