

## 皮膚癌

2020.12更新

レジメン名	一般名	投与量	投与方法	投与日（用法）	1サイクルの期間	癌腫
Avelumab療法	アベルマブ	10 mg/kg	点滴静注	d1	14日	メルケル細胞癌
CA療法	シスプラチン	60 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	d1	21日	有棘細胞癌
	ドキシソルビシン	30 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	d1		
Eri療法	エリブリン	1.4 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	d1, 8	21日	皮膚血管肉腫
Ipilimumab療法	イピリムマブ	3 mg/kg	点滴静注	d1	21日	悪性黒色腫
Nivo+Ipi療法	ニボルマブ	80 mg/body	点滴静注	d1	21日	悪性黒色腫
	イピムマブ	3 mg/kg	点滴静注	d1		
Nivolumab療法(2週毎)	ニボルマブ	240 mg/body	点滴静注	d1	14日	悪性黒色腫
Nivolumab療法(4週毎)	ニボルマブ	480 mg/body	点滴静注	d1	28日	悪性黒色腫
Pembrolizumab療法(3週毎)	ペムブロリズマブ	200 mg/body	点滴静注	d1	21日	悪性黒色腫
Pembrolizumab療法(6週毎)	ペムブロリズマブ	400 mg/body	点滴静注	d1	42日	悪性黒色腫
PTX療法	パクリタキセル	100 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	d1	7日	皮膚血管肉腫
ベムラフェニブ療法	ベムラフェニブ	960mg/回	経口	連日服用 (1日2回)	連日	悪性黒色腫
ダブルフェニブ トラメチニブ療法	ダブルフェニブ	150mg/回	経口	連日服用 (1日2回空腹時)	連日	悪性黒色腫
	トラメチニブ	2mg/回	経口	連日服用 (1日1回空腹時)		
ダブルフェニブ療法	ダブルフェニブ	150mg/回	経口	連日服用 (1日2回空腹時)	連日	悪性黒色腫