

みぎ・ひだり 硝子体手術を受ける患者さんへ

【患者さん用クリニカルパス】

傷病名:網膜剥離 症状:視力低下

ID:

患者氏名:

様

日付	月 日(曜日)	月 日(曜日)		月 日(曜日)	月 日(曜日) ~ 日(曜日)	月 日(曜日)
経過(病日)	入院当日	手術当日		術後1日目	術後2日目～4日目	術後5日目(退院)
		手術前	手術後			
達成目標	入院から退院までの経過がわかる	手術日程が理解でき手術が受けられる	症状出現時には適切な対処が受けられる			退院時の指導内容がわかる
説明・指導	・名前を確認しリストバンドを装着します ・入院生活・手術について説明があります ・うつ伏せ療法の説明があります 	・手術する眼を確認します ・入れ歯や補聴器(みぎ・ひだり)は外して入室します ・手術時間は進行状況により変わることがあります	・手術中は頭を動かさないようにしてください。 ・痛みがある場合はお話をください。 ・手術後からうつぶせ療法が開始となります。身体に痛みがある場合はお話をください。	目や身体に痛み、皮膚の赤みがないか確認を行います。 苦痛がある際は遠慮なくお話し下さい。		パンフレットを配布します。 点眼、退院指導を行います。 退院後の体位を説明します。
検査・治療	診察、視力検査をします	時間になったら手術室へ移動します	・心電図や血圧計をつけます ・手術前に眼を消毒し、顔を布でおおいます ・麻酔の注射をして、手術が始まります	毎日、朝に診察をします。診察の時間は当日、お知らせします。 		
点眼		手術の約2時間前から点眼を開始します	手術しない方の眼は点眼を継続します	手術した方の眼は、手術翌日から点眼を開始します		
内服・点滴	いつも飲んでいる薬は継続して内服します	手術直前から点滴を開始します		いつも飲んでいる薬は継続して内服します 		
食事	食事は基礎疾患(糖尿病・高血圧など)によって治療食となることがあります					
生活・行動	歩行は自由です	手術2時間前から部屋で待機します	歩行は自由ですが、うつぶせ療法のため安静の期間があります。医師の指示のもとに説明します。			
清潔	シャワー・入浴・洗髪ができます	シャワー・入浴・洗髪ができません		シャワーができます 洗髪はできません	術眼はテープで保護し、シャワー・入浴・洗髪ができます	
その他	心配なことや不安なことは、いつでも相談して下さい。					

注) 予定は現時点で考えられるものであり、今後検査等を進めていくにしたがって変わることがあります。

岩手医科大学附属病院

眼科