

ID: 患者氏名: 様

	化学療法開始準備	化学療法(シスプラチン)	化学療法終了後					
	入院日	投与日	退院日					
	/	/	/ ~ 症状や副作用の改善具合で退院日を決定します。					
目標	治療の経過がわかる	予定どおりに治療が終了する	不安なく退院後の日常生活をおくることができる					
説明指導	<ul style="list-style-type: none"> 入院生活について説明します。 尿をためる方法について説明します。 予測される副作用および予防法・出現時の対処法について説明があります。 	<ul style="list-style-type: none"> 点滴の入っているところが痛くなったり、腫れたり、重苦しくなった時は教えて下さい。医師・看護師が診察いたします。 副作用が出現した時は教えて下さい。症状を軽くするための注射や点滴などをいたします。 	<ul style="list-style-type: none"> 次回外来日について説明があります。 退院後、体調不良時は「外科外来」にお電話ください。 岩手医科大学付属病院 019-613-7111(代表) 					
治療処置点滴	<ul style="list-style-type: none"> 退院日まで、1日1回、体重測定をして下さい。(点滴の量が多くなりますので、体重の増加に応じて利尿剤を使うことがあります) 	<ul style="list-style-type: none"> ○シスプラチンという抗がん剤を使用します。 	<ul style="list-style-type: none"> 採血が問題なければ退院可能です。 					
		<p style="text-align: center;">スケジュール</p> <ul style="list-style-type: none"> 朝6時から点滴がはじまります。機械を使用し、正確に点滴を行います。 副作用の予防として、吐き気止め・利尿剤・ステロイド剤などの点滴をします。 尿を計測していただきます。計測し忘れた場合は看護師にお知らせください。 		<p style="text-align: center;">抗がん剤の主な副作用</p> <p>(投与開始直後～数時間) 発疹・発赤などのアレルギー症状 →抗アレルギー剤・ステロイド剤投与</p> <p>(投与開始から1～2日後から) 吐き気・嘔吐・食欲不振などの消化器症状 →吐き気止めの注射・点滴</p> <p>(投与開始から数日経過してから) 白血球減少 → 白血球を増加する注射 下痢 → 整腸剤や下痢止め 口内炎 → 口内炎の内服薬や塗り薬</p> 				
検査	<ul style="list-style-type: none"> 採血があります。 		<ul style="list-style-type: none"> 採血があります。 					
食事内服	<ul style="list-style-type: none"> ふだんどおりの食事がかまいません。食事がとおりづらい方はお知らせください。 薬剤師が内服薬の確認をいたします。 エスワンの内服を続けてください。 水分摂取をしっかりとしましょう。 	<ul style="list-style-type: none"> 食欲がないときは無理に食事をとらなくてかまいません。食事形態の変更も可能です。 エスワンの内服を続けてください。 	<ul style="list-style-type: none"> 退院後も決まった日にちまでエスワンの内服を続けてください。 水分摂取をしっかりとしましょう。1日1500ml(ペットボトル3本分)が目安です。 					
生活行動清潔	<ul style="list-style-type: none"> 歩行は自由です。 	<ul style="list-style-type: none"> 化学療法でだるさが強いときは安静にして休みましょう お風呂もつらいときは体をおふきしてします。 	<p style="text-align: center;">投与スケジュール</p> <ul style="list-style-type: none"> 1コースを5週間として、以下のスケジュールで行う予定です。体調に応じて2コース目の開始は前後することがあります。次コースの開始前に効果判定の検査をおこないます <p style="text-align: center;">シスプラチン点滴</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td>1週目</td> <td>2週目</td> <td>3週目</td> <td>4週目</td> <td>5週目</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">← エスワン朝夕内服 →</p>	1週目	2週目	3週目	4週目	5週目
1週目	2週目	3週目	4週目	5週目				
その他症状	<ul style="list-style-type: none"> エスワンを1週間内服して副作用がある場合は医師にお知らせください。 発熱のある場合は、化学療法を中止・延期いたします。医師・看護師にお話してください。 	<ul style="list-style-type: none"> 副作用のひどい時は、抗がん剤を減量したり、化学療法を中止します。 いつでも医師・看護師に御相談ください。 						

注) 予定は現時点で考えられるものであり、今後検査などを進めていくにしたがって変わることがあります