

オプジーボ+エスワン+オキサリプラチン(Nivo+SOX)療法

傷病名: 胃癌

【患者さん用クリニカルパス】

ID: 氏名 様

西・東 病棟 号室

NivoSOX療法

	入院当日、化学療法 入院、投与日 /	化学療法終了後 退院日 / ~ 症状や副作用の改善具合で退院日を決定します。
目標	治療の経過がわかる。予定どおりに治療が終了する。	不安なく退院後の日常生活をおくることができる。
説明指導	<ul style="list-style-type: none"> 入院生活について説明します。 予測される副作用および予防法・出現時の対処法について説明があります。 点滴の入っているところが痛くなったり、腫れたり、重苦しくなった時は教えてください。 副作用が出現した時は教えてください。症状を軽くするための注射や点滴などをいたします。 	<ul style="list-style-type: none"> 次回外来日について説明があります。 退院後、体調不良時は「外科外来」にお電話ください。 岩手医科大学付属病院 019-613-7111(代表) 
治療処置点滴	<ul style="list-style-type: none"> 入院時に、体重測定をして下さい。  <p>○オプジーボ・オキサリプラチンという抗がん剤を使用します。</p> <p style="text-align: center;">スケジュール</p>	<p style="text-align: center;">抗がん剤の主な副作用</p> <p>(投与開始直後～数時間) 発疹・発赤などのアレルギー症状→抗アレルギー剤・ステロイド剤投与 (投与開始から1～2日後から) 吐き気・嘔吐・食欲不振などの消化器症状→吐き気止めの内服・注射、点滴 (投与開始から数日経過してから)</p> <p>白血球減少 → 白血球を増加する注射 下痢 → 整腸剤や下痢止め 口内炎 → 口内炎の内服薬や塗り薬 手足のしびれ → しびれを抑える薬 手足の荒れ → 保湿剤やステロイド軟こう</p> 
	<ul style="list-style-type: none"> 入院後、準備ができ次第点滴がはじまります。 副作用の予防として、吐き気止め・ステロイド剤などの点滴をします。 投与時間はおよそ3時間です。 	
検査	<ul style="list-style-type: none"> 採血があります。(外来で行っている場合は不要です) 	<ul style="list-style-type: none"> 検査は特にありません。
食事内服	<ul style="list-style-type: none"> ふだんどおりの食事でかまいません。食事がとおりづらい方はお知らせください。 薬剤師が内服薬の確認をいたします。 夕食後からエスワン(抗がん剤)の内服が開始になります。 水分摂取をしっかりとしましょう。  	<ul style="list-style-type: none"> 退院後も決まった日にちまでエスワンの内服を続けてください。 水分摂取をしっかりとしましょう。 1日1000-1500ml(ペットボトル2-3本分)が目安です。 
生活行動清潔	<ul style="list-style-type: none"> 歩行は自由です。 化学療法でだるさが強いときは安静にして休みましょう。 お風呂もつらいときは体をおふきしてします。 	<p style="text-align: center;">投与スケジュール</p> <ul style="list-style-type: none"> 1コースを3週間として、以下のスケジュールで行う予定です。体調に応じて2コース目の開始は前後することがあります。 <p style="color: red;">オプジーボ・オキサリプラチン点滴</p> 
その他症状	<ul style="list-style-type: none"> 発熱のある場合は、化学療法を中止・延期いたします。医師・看護師にお話してください。 	

注) 予定は現時点で考えられるものであり、今後検査等を進めていくにしたがって変わることがあります。

岩手医科大学附属病院

外科