

ID: \_\_\_\_\_ 患者氏名: \_\_\_\_\_ 様

	入院当日	手術2日前	手術前日	手術当日	月 日	術後1日目	術後2日目	術後3日目~4日目	退院日
	月 日	月 日	月 日	手術前	手術後	月 日	月 日	月 日~ 月 日	月 日
目標	入院から退院までの経過がわかり、心身ともに手術を受ける準備ができる。				血尿や痛みによる苦痛がない。		血尿が落ち着き、尿の管を抜くことができる		退院後の過ごし方がわかる
説明指導	看護師より入院中のオリエンテーション（説明）を行います。 	医師から手術の説明を行います。承諾書、輸血同意書にサインしていただきます。看護師より術前オリエンテーションを行います。 		ご家族に医師から手術後の説明をします。		離床の説明をします。なるべく早期に歩いたほうが回復が早まります。 	1日に1000~1500mLの尿量を目安に、1500~2000mLの水分を摂りましょう。（夕食後からは控えめに） 		退院後の注意点についてパンフレットを用いて説明します。1日に1000~1500mLの尿量を目安に、1500~2000mLの水分を摂りましょう。（夕食後からは控えめに）血尿、発熱など症状の変化があったときは、早めに受診してください。定期的を受診をしましょう。
治療処置点滴	麻酔科の診察があります。					手術後、翌日まで点滴が続きます。 点滴を2本行います。10時と16時に抗生剤の点滴をします。点滴が終わったら、点滴の管を抜きます。			
検査						血液検査、レントゲンがあります。  			
内服	現在飲んでいる内服薬の確認をします。内服薬は基本的に継続内服とします。（中止する薬がある時は説明します。）						抗凝固薬を休薬していた場合は、主治医の指示で再開します。 		
生活行動安静度	特に制限はありません 		____時頃、主治医・看護師と手術室へ移動します。それまで病室で安静にさせていただきます。	ベッド上で安静にさせていただきます。 下肢の静脈血栓予防のためフットポンプで足のマッサージをします。	歩行ができるようになります。初回歩行は看護師が付き添います。	特に制限はありません。		手術後1~2週間頃にかさぶたがとれ血尿がでることがありますが、安静にして、水分を多めに摂取してください。だんだん薄くなるようであれば心配ありません。性生活は約1ヶ月間は控えましょう。	
排泄			____時頃、浣腸をします。	手術室で尿の管が入ってきます。	排便のときはトイレまで歩行できます。	様子を見ながら尿の管を抜きます。		便秘でりきむと出血しやすいため、りきまず排便を行えるように、水分の摂取と下剤の服用で調節してください。	
清潔	シャワー浴ができます。 		肌着は脱いで、パンツと病衣のみに着替えます。寒い時は、靴下やカーディガンを羽織ってもよいです。リストバンドを確認します。		体を拭きます。 	体を拭きます。シャワー浴が許可になる場合があります。	シャワー浴ができます。 		入浴ができます。 ※出血を予防するため熱いお風呂や長風呂はさけてください。 
食事	基礎疾患（糖尿病・高血圧など）に応じて、治療食をお出しすることもあります。 		夕食後から食事はできません。	何も食べられません。____時以降水分を飲むことができません。	手術後の状態に応じて、水分・食事が開始となります。 		約1ヶ月はアルコール類や刺激の強い食品は避けましょう。		
その他	院内禁煙となっております。大部屋での携帯電話の使用はご遠慮ください。			付き添いは必要ありません。	痛み、尿がつまったと感じたとき、吐き気がありましたら看護師にお知らせください。		退院後に異常がありましたらすぐにご連絡ください。（尿が出にくい・血尿・排尿時に血塊が出た・38度以上の発熱）		

注) 予定は現時点で考えられるものであり、今後検査等を進めていくにしたがって変わることがあります。