

ID： 患者氏名： 様

	入院当日(治療前)	治療の期間	退院日(治療終了後)																		
	月 日	月 日～ 月 日(日間)	月 日																		
目標	治療の経過が分かる	予定どおり治療が終了する	副作用への対処法を理解し実行できる																		
説明・指導	入院生活について説明します。 腎機能検査のため、尿をためる方法について説明します。 予測される副作用および予防法・出現時の対処方法について説明があります。薬剤師からの薬の説明があります。	点滴中、針の入っているところが痛くなったり、腫れたり、重苦しくなったら、すぐに教えてください。 こまめに水分補給をしてください。	退院指導を行います(生活指導や次回外来再診日の連絡)																		
治療処置点滴	身長・体重を測定します。 	<p style="text-align: center;">スケジュール(1日目)</p> <table border="1" style="width: 100%; background-color: #FFFF00;"> <tr> <td style="text-align: center;">①</td> <td style="text-align: center;">30分</td> <td>グラニセトロンとデキサート(ステロイド)という吐き気止めを行います。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">②</td> <td style="text-align: center;">30分</td> <td>アドリアシン(抗がん剤)を点滴します。</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">スケジュール(2日目)</p> <table border="1" style="width: 100%; background-color: #FFFF00;"> <tr> <td style="text-align: center;">①</td> <td style="text-align: center;">30分</td> <td>プロイメンドという吐き気止めを行います。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">②</td> <td style="text-align: center;">30分</td> <td>アロキシとデキサート(ステロイド)という吐き気止めを行います。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">③</td> <td style="text-align: center;">30分</td> <td>アドリアシン(抗がん剤)を点滴します。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">④</td> <td style="text-align: center;">3時間</td> <td>シスプラチン(抗がん剤)を点滴します。</td> </tr> </table> <p>☆点滴はヴィーンDという水分補給のための補液を2日目抗がん剤の投与前から開始します。その後、5日目の24:00まで継続的に点滴による水分補給を行っていきます。吐き気がひどいときは吐き気止めを追加します。 ☆アドリアシン投与後～1日は、尿が赤くなる場合がありますが、薬の色ですので心配はいりません。</p>	①	30分	グラニセトロンとデキサート(ステロイド)という吐き気止めを行います。	②	30分	アドリアシン(抗がん剤)を点滴します。	①	30分	プロイメンドという吐き気止めを行います。	②	30分	アロキシとデキサート(ステロイド)という吐き気止めを行います。	③	30分	アドリアシン(抗がん剤)を点滴します。	④	3時間	シスプラチン(抗がん剤)を点滴します。	<p>抗がん剤の主な副作用 発症時期による症状と対処方法について、以下のものがあげられます。</p> <p>【投与から1～2日後】 便秘症 → 便秘薬(緩下剤)の内服 吐き気・嘔吐・食欲不振などの消化器症状 → 吐き気止めの注射</p> <p>【投与から数日間経過してから】 口内炎 → うがいや抗炎症薬の軟膏を塗布 貧血 → 輸血(頻度は稀です) 血小板減少 → 血小板輸血(頻度は稀です)</p> <p>【投与から1～2週間経過してから】 白血球減少 → G-CSF製剤(白血球を増やす薬)を注射 脱毛 → かつらやバンダナなどを使用 味覚の変化 → 味付けの工夫、うがいの励行 聴力障害 → 耳鼻科を紹介</p>
①	30分	グラニセトロンとデキサート(ステロイド)という吐き気止めを行います。																			
②	30分	アドリアシン(抗がん剤)を点滴します。																			
①	30分	プロイメンドという吐き気止めを行います。																			
②	30分	アロキシとデキサート(ステロイド)という吐き気止めを行います。																			
③	30分	アドリアシン(抗がん剤)を点滴します。																			
④	3時間	シスプラチン(抗がん剤)を点滴します。																			
内服	現在飲んでいる内服薬の確認をします。内服薬は基本的に継続内服とします。 		症状に応じて内服薬が処方される可能性があります(吐き気止めや便秘薬など)。																		
検査	化学療法に必要な検査を行います。(血液検査、尿検査)	24時間尿をためていただき、尿量を測定して腎機能検査を行います。体調に応じて血液検査を行います。	体調に応じて血液検査をすることがあります。 																		
食事	基礎疾患(糖尿病・高血圧など)に応じて、治療食が出ます。	食事の制限は特にありません。水分を取るように心掛けて下さい。吐き気のために食べられないときには、食事の変更ができますので相談ください。症状にあわせて食事内容を変更することがあります。	特に食事や行動の制限はありません。白血球数が減少すると抵抗力が弱くなるため、人混みは避け、うがい・手洗いをしっかりと行い感染に注意してください。血液データに応じて食事や行動の制限がある場合があります。																		
生活・行動	特に行動制限はありません。	特に行動制限はありません。 	<p style="text-align: center;">☆1コース21日で以下の予定で行います</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">アドリアシン 45mg/m2</td> <td style="text-align: center;">1 2</td> <td style="text-align: center;">21</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">シスプラチン 120mg/m2</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> </tr> </table> <p>この治療を数回繰り返します。治療の内容は変更になることがあります。</p>	アドリアシン 45mg/m2	1 2	21	シスプラチン 120mg/m2	1													
アドリアシン 45mg/m2	1 2	21																			
シスプラチン 120mg/m2	1																				
清潔	シャワー浴、または入浴ができます。 																				
その他	熱が出た場合や検査データに異常のある場合は、化学療法を延期することもあります。	他に気になる症状がありましたら、申し出てください。 																			

注) 予定は現時点で考えられるものであり、今後検査等を進めていくにしたがって変わることがあります。