

内視鏡的大腸粘膜下層剥離術を受ける患者さんへ

【患者さん用クリニカルパス】

ID 患者氏名 様

	入院当日～	治療当日（術前）	治療当日（術後）	術後1病日	術後2病日	術後3病日	退院日
	月 日～	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
目標	医師、看護師の説明が理解できる		出血、穿孔がない	出血がない			退院することができる
説明・指導	入院生活や前処置について説明があります 	便を看護師に見せてください 便がきれいにならないときは浣腸をします		腹痛発熱があれば教えてください 便が出たら必ず出血がないか確認してください			退院後異常がありましたら すぐにご連絡ください
治療処置点滴		 点滴を3本と抗生剤を2本します 呼ばれたら内視鏡室へ移動します		 点滴を3本と抗生剤を2本します 	点滴を1本終了したら 針を抜きます		
内服	ピコスルファートナトリウムと マグコロール散68%分包50g という下剤を13・20・21時に 内服します	  朝に吐き気止めと ニフレックという 下剤を飲みます					
検査				 朝に採血が あります			
食事	 検査食が出ます	 食事は朝から 食べられません お茶や水は 摂ることができます	 水分を摂ることができます	3分粥が出ます		 5分粥が出ます	
生活・行動	 制限はありません		 術後は ベッド上安静です	許可が出れば病棟内の 歩行ができます 		 制限はありません 	
清潔	 シャワーができます	シャワーはできません			体を拭くことができます 		 シャワー浴ができます
その他	 便が出づらい方や 腹痛のある方は 看護師にお知らせください	  ヘアピンや指輪など 金属類は外して下さい	許可がおりれば退院できます 腹痛や発熱などの症状が ある時はすぐに外来へ ご連絡ください 				

予定は現時点で考えられるものであり、今後検査等を進めていくに従って変わることがあります。

岩手医科大学附属病院

消化管内科