



ID: 患者氏名: 様

経過 日付	入 院 日 (経皮的冠動脈形成術前日)	経皮的冠動脈形成術当日 (治療前)	経皮的冠動脈形成術当日 (治療後)	3日目 (治療後1病日)	4日目 (退院日)
	月 日 ()	月 日 ()	月 日 ()	月 日 ()	月 日 ()
目標	治療の内容が理解でき、検査を受けることができる。	予定通りに治療が終了することができる。		合併症出現なく経過できる。	退院指導の内容がわかる。
説明 指導 教育	・医師より治療の説明を行います。 ・看護師が入院生活および治療の説明を行います。 (説明後、承諾書を記入し、提出して下さい) (医師・看護師の説明でわからないこと、心配なことがあれば何でもお話し下さい) ・御希望により、栄養指導・服薬指導が受けられます。	・治療中ご家族の方は東6B病棟でお待ちください。 	・医師から治療結果について説明があります。 ・治療した手首は、強く曲げたり、力を入れたり、こすったりしないで下さい。 ・患者さんが落ち着かれましたら、ご家族の方は帰宅可能となります。 		・退院指導を行います。 ・医師から検査の経過と今後の内服などについて説明があります。 (治療直後に行うこともあります) ・退院後の生活で、不安な点があれば遠慮なくお聞きください。
治療 処置	・身長・体重を測ります。 ・体温・脈拍・血圧を測ります。 ・足背の動脈と大腿の動脈の拍動を観察し印をつけます。 ・手首の動脈(正中・橈骨)の拍動を観察し印をつけます。 ・治療に必要な部位(橈骨または大腿)を必要時除毛します。	・治療の前に排尿し、検査着に着替えます。 ・1時間前に手首の表面を麻酔するためのテープを貼ります。 ・治療前に点滴を行うことがあります。	・点滴を継続します。 ・治療後、4回圧迫している空気を2mlずつ抜きます。 ・4回目の空気を抜いた2時間後に手首に巻いてあるバンドを外します。 ・治療後に採血と心電図を行います。 ・点滴終了後、針は留置したままとします。	・カテーテルを入れた部位の消毒を行います。 ・治療翌日に採血と心電図を行います。 ・症状がなければ留置針を抜去します。	・カテーテルを入れた部位の消毒を行います。
検査	・採血・胸部X線撮影・心電図の検査を行います。 ・心臓超音波検査、四肢血圧脈波検査を行うこともあります。				
生活 行動	・生活に制限はありません。 	・車椅子かベッドで1階のカテーテル検査室へ行きます。  	・治療後はベッド上で安静にして下さい。 ・治療後は、トイレまで歩くことができます。(足の付け根から行った場合は、6時間後になります) ・手首のバンドを外したら、自由に歩くことができます。		
清潔	・毛を剃った後、入浴またはシャワー浴ができます。			・傷の状態に異常がなければ入浴できます。	・傷の状態に異常がなければ入浴できます。
食事	・治療食となります。 (カロリー・塩分制限) ・水分に制限はありません。	・午前治療は朝食が出ません。 ・午後治療は昼食が出ません。	・治療後、吐き気がなければ飲水・食事をすることができます。 		
内服薬	・今まで飲んでいた薬を変更することがあります。				・退院時内服処方が必要に応じ出ることがあります。
観察			・カテーテルを入れた所の出血の有無を確認します。 ・止血用のバンドがきつすぎないか確認します。 ・帰室後1時間毎に3回、体温・脈拍・血圧・橈骨動脈の拍動の観察を行います。		
その他	・治療の状況により、足の付け根の動脈からの治療になる可能性もあります。		・治療終了後、造影剤を早く排泄するために、水分(お茶・水)を多めにとりましょう。		
備考	・特別な栄養管理の必要性 有 ・ 無				