

みぎ・ひだり 硝子体手術を受ける患者さんへ

【患者さん用クリニカルパス】

傷病名:網膜剥離 症状:視力低下

ID: 患者氏名: さん

日付	月 日(曜日)	月 日(曜日)	月 日(曜日)	月 日(曜日) ~ 日(曜日)	月 日(曜日)
経過(病日)	入院当日	手術当日		術後1日目	術後2日目~4日目
		手術前	手術後		術後5日目(退院)
達成目標	入院から退院までの経過がわかる	手術日程が理解でき手術が受けられる	症状出現時には適切な対処が受けられる		退院時の指導内容がわかる
説明・指導	<ul style="list-style-type: none"> 名前を確認しリストバンドを装着します 入院生活・手術について説明があります うつぶせ療法の説明があります 	<ul style="list-style-type: none"> 手術する眼を確認します 入れ歯や補聴器(みぎ・ひだり)は外して入室します 手術時間は進行状況により変わることがあります 	<ul style="list-style-type: none"> 手術中は頭を動かさないようにしてください。 痛みがある場合はお話をください。 手術後からうつぶせ療法が開始となります。身体に痛みがある場合はお話をください。 	目や身体に痛み、皮膚の赤みがないか確認を行います。苦痛がある際は遠慮なくお話し下さい。	パンフレットを配布します。点眼、退院指導を行います。退院後の体位を説明します。
検査・治療	診察、視力検査をします	時間になったら手術室へ移動します	<ul style="list-style-type: none"> 心電図や血圧計をつけます 手術前に眼を消毒し、顔を布でおおいます 麻酔の注射をして、手術が始まります 	毎日、朝に診察をします。診察の時間は当日、お知らせします。	
点眼		手術の約2時間前から点眼を開始します	手術しない方の眼は点眼を継続します	手術した方の眼は、手術翌日から点眼を開始します	
内服・点滴	いつも飲んでいる薬は継続して内服します	手術直前から点滴を開始します		いつも飲んでいる薬は継続して内服します 	
食事	食事は基礎疾患(糖尿病・高血圧など)によって治療食となることがあります 				
生活・行動	歩行は自由です	手術2時間前から部屋で待機します	歩行は自由ですが、うつぶせ療法のため安静の期間があります。医師の指示のもとに説明します。		
清潔	シャワー・入浴・洗髪ができます	シャワー・入浴・洗髪ができません		シャワーができます洗髪はできません	術眼はテープで保護し、シャワー・入浴・洗髪ができます
その他	心配なことや不安なことは、いつでも相談して下さい。 				

注) 予定は現時点で考えらえるものであり、今後検査等を進めていくにたがって変わることがあります。

岩手医科大学附属病院

眼科