

骨軟部肉腫 GEM + DTX 療法を受ける患者さんへ

【患者さん用クリニカルパス】

ID: 患者氏名: 様

日付	月 日 ()	月 日 () ~ 月 日 ()	月 日 ()
経過	入院当日(治療開始前)	入院当日(治療開始後) ~ 治療終了後	治療終了後~退院日
	入院時		退院時
達成目標	治療の経過がわかる。	<ul style="list-style-type: none"> 予定どおりに治療が終了する。 副作用出現時は適切に対処が受けられる。 	<ul style="list-style-type: none"> 副作用への対処法を理解し実行できる。 退院指導の内容が分かる。
検査	次の検査を行うことがあります。 血液検査、心電図、胸部エックス線撮影	<ul style="list-style-type: none"> 定期的に血液検査を行います。 	
治療・処置	身長、体重を測定します。 	<p>抗がん剤の投与スケジュールに関しましては、病棟薬剤師より説明があります。</p> <p>☆ハラヴェンは、1日目と8日目に投与されます。抗がん剤投与終了後に抜針します。</p> <p>【投与から1~2日後】</p> <ul style="list-style-type: none"> 投与時過敏症状 → 薬剤投与中あるいは投与数時間後にかゆみ、息苦しさ、発熱、汗が出るなどの症状が出た場合は、すぐに教えてください 便秘 → 下剤の内服、グリセリン浣腸 吐き気・嘔吐・食欲不振などの消化器症状 → 吐き気止めの内服または注射 <p>【投与から数日間経過してから】</p> <ul style="list-style-type: none"> 口内炎 → うがいや抗炎症薬の軟膏を塗布 <p>【投与から1週間経過してから】</p> <ul style="list-style-type: none"> 貧血 → 輸血(頻度は稀です) 血小板減少 → 血小板輸血(頻度は稀です) 白血球・好中球の減少 → G-CSF製剤(白血球を増やす薬)を注射 脱毛 → ウィッグやバンダナ、帽子などを使用 浮腫 → 弾性ストッキング装着、利尿剤の内服 	
説明・指導	<ul style="list-style-type: none"> 入院生活について説明します。 予測される副作用および予防法・出現時の対処方法について病棟薬剤師より説明があります。 	点滴中、針の入っているところが痛くなったり、腫れたり、重苦しくなったら、すぐに教えてください。こまめに水分補給をしてください。	退院指導を行います(生活指導や次回外来再診日の連絡)
内服・点滴	現在飲んでいる内服薬の確認をします。 内服薬は基本的に継続とします。 		症状に応じて内服薬が処方されることがあります。 (吐き気止めや下剤など)
食事	基礎疾患(糖尿病・高血圧など)に応じて、治療食が出ます。 	食事の制限は特にありません。たくさん水分を取るよう心掛けて下さい。吐き気のために食べられないときには、食事の変更ができますので相談ください。症状にあわせて食事内容を変更することができます。	
生活・行動	特に行動制限はありません。		<ul style="list-style-type: none"> 白血球が減少すると感染に対する抵抗力が弱くなるため、人混みは避け、うがい、手洗いをしっかりと行い感染予防を行ってください。 血液データに応じて食事や行動の制限を行うことがあります。
清潔	抗がん剤投与中は、清拭になります。化学療法が終了し、抜針後にシャワー浴ができます。		
その他	熱が出た場合や血液検査などの検査結果に異常がある場合は、化学療法を延期することがあります。	他に気になる症状がありましたら、申し出てください。	<p>GEM: 1 8 15</p> <p>DTX: 8</p> <p>退院基準 1. 有害事象に対処できている 2. バイタルに異常がない</p>

注) 予定は現時点で考えられるものであり、今後検査等を進めていくに従って変わることがあります。