

オプジーボ+エスワン+オキサリプラチン(Nivo+SOX)療法

ID:

氏名

様

傷病名:

胃癌


【患者さん用クリニカルパス】

西・東

病棟

号室

NivoSOX療法

	入院当日、化学療法	化学療法終了後	
	入院、投与日	退院日	
	/	/ ~ 症状や副作用の改善具合で退院日を決定します。	
目標	治療の経過がわかる。予定どおりに治療が終了する。	不安なく退院後の日常生活をおくることができる。	
説明指導	・入院生活について説明します。 ・予測される副作用および予防法・出現時の対処法について説明があります。 ・点滴の入っているところが痛くなったり、腫れたり、重苦しくなった時は教えて下さい。 ・副作用が出現した時は教えて下さい。症状を軽くするための注射や点滴などをいたします。 	・次回外来日について説明があります。 ・退院後、体調不良時は「外科外来」にお電話ください。 岩手医科大学付属病院 019-613-7111(代表) 	
治療処置点滴	・入院時に、体重測定をして下さい。 ○オプジーボ・オキサリプラチンという抗がん剤を使用します。 	不安なく退院後の日常生活をおくることができる。 ・体調が問題なければ退院可能です。 抗がん剤の主な副作用 (投与開始直後～数時間) 発疹・発赤などのアレルギー症状→抗アレルギー剤・ステロイド剤投与 (投与開始から1～2日後から) 吐き気・嘔吐・食欲不振などの消化器症状→吐き気止めの内服・注射、点滴 (投与開始から数日経過してから) 白血球減少 → 白血球を増加する注射 下痢 → 整腸剤や下痢止め 口内炎 → 口内炎の内服薬や塗り薬 手足のしびれ → しびれを抑える薬 手足の荒れ → 保湿剤やステロイド軟こう 	
	スケジュール		
	・入院後、準備ができ次第点滴がはじまります。 ・副作用の予防として、吐き気止め・ステロイド剤などの点滴をします。 ・投与時間はおよそ3時間です。 		
検査	・採血があります。(外来で行っている場合は不要です) 	・検査は特にありません。	
食事内服	・ふだんどおりの食事がかまいません。 ・食事がとおりづらい方はお知らせください。 ・薬剤師が内服薬の確認をいたします。 ・夕食後からエスワン(抗がん剤)の内服が開始になります。 ・水分摂取をしっかりとしましょう。  	・退院後も決まった日にちまでエスワンの内服を続けてください。 ・水分摂取をしっかりとしましょう。 1日1000-1500ml(ペットボトル2-3本分)が目安です。 	
生活行動清潔	・歩行は自由です。 ・化学療法でだるさが強いときは安静にして休みましょう。 ・お風呂もつらいときは体をおふきしてします。 	投与スケジュール ・1コースを3週間として、以下のスケジュールで行う予定です。 ・体調に応じて2コース目の開始は前後することがあります。 オプジーボ・オキサリプラチン点滴  1週目 2週目 3週目  エスワン 朝夕内服	
その他症状	・発熱のある場合は、化学療法を中止・延期いたします。 ・医師・看護師にお話ください。 		